

USING THE ABORTION PILL
USO DE LA PÍLDORA ABORTIVA

Planned Parenthood Northern California 1-925-676-0300

¿Qué es la píldora abortiva y cómo debo tomarla?

“Píldora abortiva” es el nombre popular que se le da al uso de 2 medicamentos para interrumpir un embarazo: la mifepristona y el misoprostol. La mifepristona es la primera píldora que deberás tomar y que inicia el proceso de aborto. El embarazo necesita una hormona llamada progesterona para avanzar normalmente. La mifepristona bloquea la progesterona que produce el organismo.

El segundo medicamento, el misoprostol, abre el cuello uterino y provoca la contracción del útero. Esto vacía el útero y completa el proceso. Todo el procedimiento también recibe el nombre de aborto inducido por medicamentos.

Existen algunas otras maneras de tomar estos medicamentos. Conversaremos contigo sobre tus opciones.

Antes del aborto, es importante que conozcas los beneficios, los riesgos, los efectos secundarios más comunes y qué otras opciones tienes. Nos complacerá responder cualquier pregunta que tengas.

¿Cuáles son los beneficios de la píldora abortiva?

Es una manera segura y eficaz de interrumpir un embarazo.

¿Cuál es la eficacia de la píldora abortiva?

Depende de cuán avanzado esté tu embarazo. Algunas mujeres necesitan tomar una dosis adicional de misoprostol.

| | |
|-------------------|--|
| 8 semanas o menos | Aproximadamente 98 de cada 100 casos |
| De 8 a 9 semanas | Aproximadamente 96 de cada 100 casos |
| De 9 a 10 semanas | Alrededor de 91 a 93 de cada 100 casos |

¿Cuáles son los riesgos de la píldora abortiva?

El uso de la píldora abortiva es muy seguro, pero todo procedimiento médico implica riesgos.

Riesgos de la píldora abortiva

- Imposibilidad de interrumpir el embarazo: a veces los medicamentos no interrumpen el embarazo. Si esto ocurre, puedes tomar más medicamento o hacerte un procedimiento de aspiración para completar el aborto.
- Aborto incompleto: esto significa que puede quedar tejido del embarazo dentro del útero. Esto puede causar sangrado intenso, infección o ambos. Si esto ocurre, es posible que tengas que hacerte un procedimiento de aspiración u otras pruebas o tratamientos.
- Coágulos de sangre en el útero: los coágulos de sangre pueden causar calambres y dolores en el vientre. Si esto ocurre, es posible que tengas que hacerte un procedimiento de aspiración.
- Sangrado abundante o extenso: es posible que necesites tratamiento con medicamentos, un procedimiento de succión o una transfusión de sangre.
- Infección del útero: la mayoría de las infecciones se pueden tratar con medicamentos. pero existe una pequeña posibilidad de que necesites un procedimiento de aspiración. Tal vez necesites acudir al hospital o incluso someterte a otra cirugía para tratar la infección.
- Reacción alérgica: algunas mujeres pueden ser alérgicas a los medicamentos que se utilizan.
- Muerte: la muerte debido al aborto inducido por medicamentos ocurre en muy pocos casos. Es mucho más alto el riesgo de muerte durante el parto.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la píldora abortiva?

Los efectos secundarios por lo general no duran mucho. Usualmente, estos efectos no requieren tratamiento o requieren un tratamiento simple.

- Cólicos. Son más intensos poco después de tomar el misoprostol. Luego, es posible que sientas cólicos más leves por 1 o 2 días.
- Sangrado. Es más abundante poco después de tomar el misoprostol. Es posible que sangres o tengas manchas de sangre durante 4 a 6 semanas después del aborto.
- Fiebre. Es normal tener una temperatura entre 99 °F y 100 °F (37.2 °C y 37.8 °C).
- Otros. Es común tener escalofríos, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda y cansancio.

¿Qué otras opciones tengo aparte de tomar la píldora abortiva?

Si estás embarazada, hay tres opciones sobre las que puedes pensar: el aborto, la adopción o la crianza.

Hay 2 formas de abortar: tomar la píldora abortiva o hacerse un aborto en una clínica.

Podemos analizar estas opciones contigo y ayudarte, cualquiera sea la decisión que tomes.

¿Qué más debo saber?

Después de tomar la píldora abortiva, debes asegurarte de que los medicamentos hayan funcionado. Esto se puede hacer mediante un ultrasonido en la clínica o un análisis de sangre en la clínica o en el laboratorio. Te avisaremos cuándo y dónde lo haremos.

El misoprostol puede causar defectos congénitos graves si el embarazo sigue adelante.

Es normal sentir una gran variedad de emociones después del aborto. La mayoría de las mujeres sienten alivio y no lamentan su decisión. Otras pueden sentir tristeza, culpa, o arrepentimiento, sentimientos que también pueden aparecer después de tener un bebé. Si tu estado de ánimo te impide llevar a cabo tus actividades habituales, llámanos. Podemos ayudarte o remitirte a la persona indicada.

También te diremos por qué otros motivos podrías comunicarte con nosotros.

No se pueden ofrecer garantías en cuanto al resultado del aborto. En el caso poco probable de que necesites atención médica de emergencia que Planned Parenthood no pueda suministrar, serás responsable de los costos. Esto es así aun cuando Planned Parenthood te remita a otro médico o a otro hospital como consecuencia de un problema.

Tu salud es importante para nosotros. Si tienes preguntas o inquietudes, llámanos. Nos complacerá ayudarte.

Firma del paciente (y de la persona autorizada para firmar en su representación cuando sea necesario)

Fecha

Relación con el paciente: paciente padre o madre tutor legal otro _____

Doy fe de que el paciente recibió esta información, dijo que la leyó y la entendió, y tuvo la oportunidad de hacer preguntas.

Firma del testigo

Fecha