

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La ceftriaxona inyectable se usa para tratar ciertas infecciones ocasionadas por bacterias, como la gonorrea (una enfermedad de transmisión sexual), la enfermedad inflamatoria pélvica (infección de los órganos reproductores femeninos que puede causar infertilidad), la meningitis (infección de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal), y las infecciones de los pulmones, los oídos, la piel, las vías urinarias, la sangre, los huesos, las articulaciones y el abdomen. A veces, también se aplica la ceftriaxona inyectable antes de ciertos tipos de cirugía para prevenir las infecciones después de la operación. La ceftriaxona inyectable pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos derivados de la cefalosporina. Actúa al eliminar las bacterias. Los antibióticos no sirven para tratar los resfriados, la gripe u otras infecciones virales.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La ceftriaxona inyectable viene en forma de un líquido que se inyecta por vía intravenosa (en una vena) o intramuscular (en un músculo). En ocasiones se aplica como una sola dosis y a veces una o dos veces al día durante 4 a 14 días, dependiendo del tipo de infección de que se trate. La inyección de ceftriaxona pueden aplicársela en un hospital o en un consultorio médico, pero también puede inyectársela en casa. Si se aplica la ceftriaxona inyectable en casa, hágalo más o menos a la(s) misma(s) hora(s) todos los días. Siga al pie de la letra las instrucciones de la receta y pídale a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Use la ceftriaxona inyectable según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la use con más frecuencia que la indicada por su médico.

Debe empezar a sentirse mejor a los pocos días de su tratamiento con ceftriaxona inyectable. Si sus síntomas no mejoran o empeoran, llame a su médico.

Si tiene que aplicarse más de una dosis de ceftriaxona inyectable, siga inyectándosela hasta cumplir con la receta aunque se sienta mejor. Si suspende demasiado pronto el uso de la ceftriaxona inyectable u olvida algunas dosis, su infección puede quedar insuficientemente tratada y las bacterias pueden volverse resistentes al antibiótico.

¿Qué otro uso se le da a este medicamento?

A veces, la ceftriaxona inyectable también se usa para tratar la endocarditis (infección del revestimiento y de las válvulas del corazón), el chancro (ulceraciones genitales causadas por bacterias), la enfermedad de Lyme (una infección que transmiten las garrapatas y que puede afectar el corazón, las articulaciones y el sistema nervioso), la fiebre recurrente (una infección transmitida por las garrapatas que se caracteriza por episodios febriles repetitivos), la shigelosis (una infección que causa diarrea intensa), la fiebre tifoidea (una infección grave que es común en los países en vías de desarrollo), la salmonelosis (una infección que causa diarrea intensa) y la enfermedad de Whipple (una infección rara que ocasiona problemas digestivos graves). En ocasiones, también se emplea la ceftriaxona inyectable para prevenir las infecciones en casos de ataque sexual, o mordeduras humanas o de animales. Consulte a su médico sobre los riesgos de recurrir a este fármaco para tratar su afección.

A veces se receta este medicamento para otros usos; pídale más información a su médico o farmacéutico.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de que le apliquen la ceftriaxona inyectable,

- avise a su médico y farmacéutico si es alérgico a la ceftriaxona inyectable, otros antibióticos derivados de la cefalosporina o la penicilina, o cualquier otro medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbolarios está tomando o piensa tomar. No olvide mencionar ningún medicamento intravenoso ni vía de alimentación que contengan calcio, como la nutrición parenteral total (NPT, alimentación líquida que se administra por vía intravenosa a quienes no pueden comer ni digerir los alimentos).

Ceftriaxona inyectable (Rocephin)

- informe a su médico si padece o ha padecido problemas del aparato digestivo, sobre todo colitis (inflamación del intestino grueso), desnutrición (cuando no se comen o digieren los nutrientes necesarios para gozar de buena salud), o enfermedades renales o hepáticas.
- informe a su médico si está embarazada, planea estarlo o está amamantando. Si queda embarazada mientras usa ceftriaxona inyectable, llame a su médico.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Si pasa por alto una dosis, inyétesela en cuanto lo recuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, salte la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No duplique la dosis para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

La ceftriaxona inyectable puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor, sensibilidad, endurecimiento o calor en el sitio de inyección de la ceftriaxona
- dolor de cabeza
- mareo
- sudoración
- bochornos
- diarrea

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- sarpullido
- heces sanguinolentas o acuosas
- fiebre
- retortijones
- dolor o hinchazón estomacal
- náusea y vómito
- acidez estomacal
- dolor en el pecho

La ceftriaxona inyectable puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inesperado mientras toma este medicamento.

Si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de efectos adversos 'MedWatch' de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en la página de Internet [<http://www.fda.gov/MedWatch/report.htm>] o por teléfono al 1-800-332-1088.

¿Cómo debo almacenar este medicamento?

Si le van a inyectar la ceftriaxona en casa, su proveedor de atención médica le dirá dónde debe guardarla y por cuánto tiempo conservarla. Siga al pie de la letra esas instrucciones. Guarde la ceftriaxona en su envase original y fuera del alcance de los niños. Deseche todos los medicamentos vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su proveedor de atención médica cuál es la manera adecuada de desechar los medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Asista a todas las citas con su médico y el laboratorio. Es posible que su médico le oriente ciertas pruebas de laboratorio para evaluar la respuesta de su organismo a la ceftriaxona.

No permita que ninguna otra persona use sus medicamentos. Pregúntele a su farmacéutico cómo volver a surtir su receta.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener

la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

Marcas comerciales

- Rocephin

Documento revisado - 01/07/1998. Documento actualizado - 01/12/2007



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección Copyright, 2008, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Todos los derechos reservados.