

PRUEBAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Las infecciones de transmisión sexual se contagian a través de las relaciones sexuales. Una vez que se está expuesto a una infección, puede tardar días, semanas o meses que esto se refleje en una prueba. En casos muy raros, los resultados pueden ser incorrectos. Ninguna prueba o examen tiene una precisión del 100% todo el tiempo. Por lo tanto, no puede haber garantía de que un diagnóstico sea siempre correcto. Tampoco existe ninguna prueba ni examen que detecte todas las infecciones de transmisión sexual. Consulta con tu médico o enfermero acerca de tus riesgos de padecer infecciones de transmisión sexual. Tu médico o enfermero te recomendará pruebas según los síntomas, tu historia clínica y los factores de riesgo.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	ACERCA DE LAS INFECCIONES	QUIÉN DEBERÍA REALIZARSE LA PRUEBA Y CUÁNDO	¿CÓMO PUEDO HACERME LA PRUEBA?
CLAMIDIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causada por bacterias. ▪ Puede provocar secreción genital, dolor al orinar o dolor pélvico o testicular. ▪ Normalmente, no hay síntomas. ▪ Se puede curar. 	De manera sistemática, al menos, todos los años: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mujeres menores de 25 años ▪ Embarazo ▪ Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres ▪ Personas VIH+ Pruebas sobre la base del riesgo.	Análisis de orina o hisopado de la zona genital que se envía al laboratorio.
HERPES GENITAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causado por virus. ▪ Puede provocar llagas en los genitales o en otras zonas de la piel. ▪ Es posible que no provoque síntomas. ▪ Puede tratarse, pero no curarse. 	Cualquier persona con síntomas debería consultar con un médico o un enfermero.	Hisopado de la llaga, que se envía al laboratorio. Mayor precisión en el lapso de los 2 días de observados los síntomas.
VERRUGAS GENITALES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Son causadas por virus. ▪ Protuberancias genitales indoloras que, a veces, provocan picazón. ▪ Pueden tratarse, pero, en general, desaparecen por sí solas. 	Cualquier persona con inquietudes debería consultar con un médico o un enfermero.	Mediante un examen.
GONORREA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causada por bacterias. ▪ Síntomas iguales a los de la clamidia. ▪ Se puede curar. 	De manera sistemática, al menos, todos los años: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mujeres menores de 25 años ▪ Embarazo ▪ Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres ▪ Personas VIH+ Pruebas sobre la base del riesgo.	Análisis de orina o hisopado de la zona genital, que se envía al laboratorio.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	ACERCA DE LAS INFECCIONES	QUIÉN DEBERÍA REALIZARSE LA PRUEBA Y CUÁNDO	¿CÓMO PUEDO HACERME LA PRUEBA?
HEPATITIS B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causado por virus. ▪ Puede provocar fatiga, dolor abdominal y coloración amarilla en los ojos o en la piel. ▪ Es posible que no provoque síntomas. ▪ También puede contagiarse por el contacto con sangre infectada. ▪ Se encuentra disponible una vacuna preventiva. ▪ Puede tratarse, pero no curarse. 	Pruebas sobre la base del riesgo.	Análisis de sangre, que se envía al laboratorio.
HEPATITIS C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causada por virus. ▪ Tiene los mismos síntomas que la hepatitis B. ▪ Es posible que no provoque síntomas. ▪ Por lo general, se contagia por el contacto con sangre infectada. ▪ Puede tratarse, pero no curarse. 	Pruebas sobre la base del riesgo.	Análisis de sangre, que se envía al laboratorio.
VIH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se trata de un virus. ▪ Los síntomas iniciales pueden incluir una enfermedad parecida a la gripe, erupción, dolor de las articulaciones. ▪ Es posible que no provoque síntomas. ▪ Puede tratarse, pero no curarse. 	Cualquier persona sexualmente activa entre los 13 y los 65 años debería realizarse la prueba, al menos, una vez. Pruebas sobre la base del riesgo.	Análisis de sangre o hisopado bucal. Pueden enviarse al laboratorio.
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se trata de un virus. ▪ Muchos tipos están asociados con cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano o boca. ▪ Normalmente, no hay síntomas. ▪ Se encuentra disponible una vacuna preventiva. ▪ Puede tratarse, pero no curarse. 	Las pruebas de VPH se usan para detectar y tratar el cáncer cervical únicamente. No se recomiendan las pruebas de VPH por ningún otro motivo.	
MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causado por virus. ▪ Puede provocar protuberancias indoloras en la parte baja del abdomen, la zona genital o los muslos, y puede aparecer en otras zonas del cuerpo. ▪ Pueden tratarse, pero, en general, desaparecen por sí solas. 	Cualquier persona con inquietudes debería consultar con un médico o un enfermero.	Mediante un examen.
PIOJOS PÚBLICOS (LADILLAS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La provocan pequeños parásitos que se adhieren al vello. ▪ Picazón; liendres (huevos) visibles en el vello. ▪ Puede tratarse. 	Cualquier persona con síntomas debería consultar con un médico o un enfermero. No se encuentra disponible ninguna prueba.	Mediante un examen.
SARNA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La provocan pequeños parásitos en la piel. ▪ Puede provocar picazón (que empeora por la noche) y erupciones cutáneas. ▪ Puede tratarse. 	Cualquier persona con síntomas debería consultar con un médico o un enfermero. No se encuentra disponible ninguna prueba.	Mediante un examen.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	ACERCA DE LAS INFECCIONES	QUIÉN DEBERÍA REALIZARSE LA PRUEBA Y CUÁNDO	¿CÓMO PUEDO HACERME LA PRUEBA?
SÍFILIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es causada por bacterias. ▪ Puede provocar una llaga indolora en los genitales o en la boca, y erupción en las manos o en los pies. ▪ Es posible que no provoque síntomas. ▪ Puede tratarse. 	<p>Cualquier persona con síntomas debería consultar con un médico o un enfermero. Se recomiendan las pruebas en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embarazo ▪ Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres ▪ Otras personas con riesgo 	<p>Análisis de sangre o muestra de una llaga obtenida por hisopado, que se envían al laboratorio.</p>
TRICOMONIASIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La provocan pequeños parásitos en los genitales. ▪ Puede causar secreción genital, picazón y dolor al orinar. ▪ Es posible que no provoque síntomas. ▪ Puede tratarse. 	<p>Cualquier persona con síntomas debería consultar con un médico o un enfermero.</p> <p>No se recomienda realizar las pruebas en personas que no tengan síntomas.</p>	<p>Hisopado de la zona genital o análisis de una muestra de secreción. Pueden enviarse al laboratorio.</p>